

I Coronaens tid

Coronavirus og nedlukning af landet påvirker os alle både privat og i staldene. Grisene kan ikke blive smittet, og derfor skal man ikke frygte den daglige kontakt med grisene. LVK svinedyrlægerne fortsætter så vidt muligt deres daglige virke, og følger sundhedsstyrelsens vejledninger og opfordrer alle til det samme.

PRRS virus påvist på Ornestation Mors 2



Ornestation Mors 2 er en vaccineret besætning, hvilket betyder at ornerne har en vis immunitet mod nysmitte med PRRS. Til trods for dette er der fra 3. til 11. marts fundet 8 PRRS1-positive orner, som alle er aflivede. Situationen på Ornestation Mors 2 er alvorlig, og LVK Svinedyrlægerne følger forløbet nøje. Mængden af virus der er fundet i blodprøverne vurderes som lav i forhold til det, der ses ved klassisk nysmitte, som var tilfældet ved udbruddet på Hatting Horsens. Hele besætningen

på 383 orner er blodprøvet, og det forventes at alle orner med PRRS1 i blodet nu er aflivet. Den 16. marts blev alle resterende orner testet igen, og fundet negative. Ornestation Mors 2 er derfor åbnet igen. Under udbruddet blev der også testet sæd fra positive orner, og dette er fundet negativt. Analysemetoden anvendt på sæd er dog ikke gennemtestet, og derfor vil laboratoriet ikke give garanti for ægtheden af svaret. Har jeres besætning modtaget sæd fra Ornestation Mors 2 i periode fra 27 februar til 3 marts, skal I kontakte jeres LVK Svinedyrlæge, såfremt dette ikke allerede er sket. Det er LVK Dyrlægernes holdning, at strategi nu skal udarbejdes i den enkelte besætning, hvor risiko afvejes med evt. økonomiske tab.

PAS PÅ med hydratkalken

Med års mellemrum ses der skader på svin som følge af forkert brug af hydratkalk. Hydratkalk er en base (høj pH) med desinficerende egenskaber overfor virus og bakterier. Hydratkalk er stærkt ætsende for hud, øjne, slimhinder og kan give langsomt helende sår. Vi fraråder, at tørt hydratkalk strøs ud i stibunden og efterfølgende gennemvædes, da der somme tider er "klumper" der er svære at få gennemvædet ordentligt. Hvis der anvendes hydratkalk, anbefale vi at det først opløses i vand (1,5 kg pr. 10 liter vand) som udlægges i stibunden, hvorefter opløsningen skal have tid til at tørre HELT op, før der indsættes grise (normalt 1 til 2 døgn).



Svinedyrlægerne Øst



Svinefagdyrlæge
Claus Bahne Heisel
Mobil: 21715300
Mail: ch@lvk.dk



Svinefagdyrlæge
Lars Grøntved
Mobil: 21715282
Mail: lg@lvk.dk



Svinedyrlæge
Simon Åkerblom
Mobil: 21715279
Mail: saa@lvk.dk



Svinedyrlæge
Trine Christner Månsson
Mobil: 21715274
Mail: tcm@lvk.dk



Svinedyrlæge
Christian Christoffersen
Mobil: 21715302
Mail: cc@lvk.dk



Brintoverilte til pleje af udskudt endetarm

Brintoverilte har før i tiden været hyppigt brugt til sårrens hos mennesker, men anvendes ikke mere, da det hæmmer sårheling i forhold til andre produkter. LVK Svinedyrlægerne ser dog intet problem i, at brintoverilte anvendes til pleje af udskudt endetarm. Brintoveriltens opbrusende egenskab bidrager til fjernelsen af urenheder fra såret, og iltning af tarmvævet hæmmer betændelse.

Desuden kan brintoverilte også anvendes til skuldarsår og halebid. LVK Svinedyrlægerne anbefaler, at der anvendes en 0,5-1 % opløsning af brintoverilte på forstøverflaske til sårpleje.



Svinefagdyrlæge
Claus Bahne Heisel
Mobil: 21715300
Mail: ch@lvk.dk



Svinefagdyrlæge
Lars Grøntved
Mobil: 21715282
Mail: lg@lvk.dk



Svinedyrlæge
Simon Åkerblom
Mobil: 21715279
Mail: saa@lvk.dk



Svinedyrlæge
Trine Christner Månsson
Mobil: 21715274
Mail: tcm@lvk.dk



Svinedyrlæge
Christian Christoffersen
Mobil: 21715302
Mail: cc@lvk.dk