LVK
Fynsvej 8
9500 Hobro
Tlf. 98520044
E-mail: bn@lvk.dk
www.lvk.dk

Pas på "billige" foderblandinger.

Billige foderblandinger:
Der fodres for tiden (efteråret 2009/vinter 2010) med mange "billige" foderblandinger. Disse foderblandinger indeholder ofte en del alternative proteinkilder, hovedsageligt rapskager og solsikkeskrå. Jeg har i nogle besætninger set nogle meget uheldige sygdomsmæssige konsekvenser af disse alternative blandinger.
Jeg beskriver her 4 cases fra praksis, som omhandler nogle af mine erfaringer med de alternative foderblandinger.

Mulig uheldige sygdomsproblemer:
Hvis der anvendes alternative proteinkilder, er det meget vigtigt at kende mavesundheden ved sine grise, lad din dyrlæge obducere grisene ved besøgene Ligeledes er PCV2 vigtigt at have i tankerne. Jeg har erfaret at PCV2 og alternative foderblandinger, arbejder sammen i grisen og kan få grisene til at knække helt sammen.
Ligeledes kan der ses en forøget tendens til diarré ved fodring med alternative proteinkilder.

Det er hovedsageligt ved blandingerne med meget raps 10-12%, vi har set de største sygdoms-problemer. Omkring 5% solsikke i foderblandingen er mindre problematisk.

Grisenes størrelse og kvalitet:
For at kunne fodre med alternative proteinkilder, skal grisen være over 30 kg ved indsættelse i slagtesvinestalden og være af rigtig god kvalitet.
Hvis der anvendes slutfoder, bør det overvejes kun at anvende rapskager/solsikke i slutfoderet. Store grise kan betydelig bedre tåle disse produkter i forhold til 30 kg. gris.

Den reelle pris:
Vær opmærksom på prisen på de alternative blandinger. Hvor meget er der reelt at spare pr. FE ved disse alternative foderblandinger?
Hvis der fodres med tilskudsfoder og eget korn, er det vigtigt at huske, at iblandingsprocenten er højere ved tilskudsfoderblandinger baseret på alternative proteinkilder i forhold til soja. Dette bevirker at der kan anvendes mindre af eget korn (som måske skal sælges til 70 kr. pr. tønde).

Konklusion:
Ved anvendelse af alternative proteinkilder, skal følgende overvejes

- Hvad er FE prisen i forhold til soja baserede blandinger
- Hvis der anvendes eget korn, skal det mindre forbrug af eget korn tages med i betragtningen
- Hvis der er problemer med PCV2, mavesår eller diarré i besætning, kan alternative proteinkilder ikke anbefales.
- Større grise tåler bedre alternative proteinkilder, anvend evt. kun rapskager/solsikke i slutfoderet.
- Alternative proteinkilder kræver store og sunde grise.

Hvis der fodres med rapskager eller solsikke, og der kommer problemer med mavesår (blege grise), diarré og/eller nedsat tilvækst, er det med hurtigt at få problemet undersøgt nærmere.

Hvis det skal forsøges at anvende alternative proteinkilder, skal der være en ordentlig besparelse pr. FE.
Husk: Sojabaserede blandinger er langt mere driftsikre end de alternative blandinger.

Case 1:
Slagtesvinebesætning med 3 site. Der indkøbes 30 kg grise af god kvalitet.
Site 1: Hjemmeblandet vådfoder med hvede, byg, sojaskrå og gærfløde, når dette er til rådighed.
Site 2: Hjemmeblandet tørfoder med hvede, byg og sojaskrå.
Site 3: Indkøbt pelleteret færdigfoder. Der drives alt ind alt ud drift på ejendomsniveau.

På site 1 og 2 forløber produktionen særdeles fornuftige, fornuftig dødelighed (1,8%), fornuftig tilvækst (862 gram) og ingen tegn på mavesår.
På site 3 bliv der skiftet foderblanding midt i et hold grise, som vejede ca. 60-70 kg. Der blev skiftet til en foderblanding indeholdende 53% byg, 12% rapskager, 11% hvede, 10% triticale, 4,5% soja og 3% solsikke. Foderskiftet gav ikke de store problemer ved det hold grise der var på stald. Ved næste hold (indsat ved ca. 30 kg) opstod problemerne. Der kom symptomer på mavesår (blege grise, utrivelige). Ligeledes faldt tilvæksten, grisene på site 3 blev overhalet med 2-3 uger i forhold til grisene på site 1.

Case 2:
Slagtesvinebesætning med 2 site. Der indkøbes 30 kg grise af god kvalitet.
Site 1: Vådfoder på baggrund af færdigfoder.
Site 2: Indkøbt pelleteret tørfoder.
På både site 1 og 2 har produktionen forløbet særdeles tilfredsstillende de første måneder efter

Fynsvej 8
9500 Hobro
Tlf. 98520044
E-mail: bn@lvk.dk
www.lvk.dk

endt sanering i sommeren 2009. Fra primo oktober begynder dødeligheden at stige, værst på site 2. Ved dyrlægebesøget i oktober, obduceres der grise på site 2 med mavesår. I samråd med foderstoffen skiftes der på site 2 foderblanding til en blanding med 50% byg, 12% rapskager, 11,6% hvede, 10% triticale, 4,5% soja og lidt solsikke. Den megen byg skulle være godt for mavesundheden.

Ved dyrlægebesøget i november obduceres der 5 grise på site 2, alle med mavesår, heraf 4 med akut blødende mavesår. Dødeligheden var steget efter foderskiftet.

Case 3 og 4:
Slagtesvineproduktioner med egne sohold. Grisene fodres med stort set identiske blandinger, som dem beskrevet i case 1 og 2.
I disse to besætninger er dødeligheden normal, omkring 0,5-2 % og meget få grise med tegn på mavesår.

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste
Svinedyrlægerne Øst



Kristian Dedenroth Krogh
Svinedyrlæge
Langøgade 15, 1. tv
2100 København Ø
M: +45 2171 5281
F: +45 3920 3908
E: kkh@lvk.dk