Nyhedsbrev marts 2019

LVK Svinedyrlægerne Nord

Har du målt rygspækket?

LVK svinedyrlægerne tilbyder rygspækmåling som service til medlemmerne. Rygspækmåleren anvendes til at fastslå tykkelsen af rygspækket på avlsdyr. Metoden har været anvendt i Danmark i snart ti år, og er stadig højaktuel. Korrekt rygspæktykkelse ved løbning sikrer det optimale antal levendefødte på især gylte. Desuden er den korrekte tykkelse ved faring afgørende for soens ydeevne og holdbarhed. Kontakt din LVK svinedyrlæge for yderligere information.

Halebid Risikovurdering

Fra 1 april 2019 skal alle svineproducenter have udarbejdet en risikovurdering af halebid. Målet med planen er at finde områder, som kan forbedres og dermed reducere risikoen for halebid. Seges har udarbejdet en række emner, som kan gennemgås i besætningen til hjælp. Generelt er der tale om basale emner og dermed bliver fokus på det gode landmandskab. LVK svinedyrlægerne hjælper gerne med gennemgang og udarbejdelse af handlingsplan, men dette er ikke et krav, da det i lovgivningen er anført, at det er den besætningsansvarlige, som skal lave planen. Nedenstående ses Seges strategi for at få grise med lange haler.



LVK Svinedyrlægerne Nord

Svinefagdyrlæge
Teamleder
Tage Rødbro
Mobil: 30994624
Mail: tr@lvk.dk

Svinefagdyrlæge
Bettina Jensen
Mobil: 21715295
Mail: bj@lvk.dk

Svinefagdyrlæge
Charlotte Johannessen
Mobil: 21715298
Mail: cj@lvk.dk

Svinefagdyrlæge
Kjetil Johansen
Mobil: 21689175
Mail: ki@lvk.dk

Svinedyrlæge
Kristian Krogh
Mobil: 21715281
Mail: kkh@lvk.dk

Svinedyrlæge
Annette B. Bech
Mobil: 21715287
Mail: ab@lvk.dk

Svinedyrlæge
Christian Christoffersen
Mobil: 21715302
Mail: cc@lvk.dk

Nyhedsbrev marts 2019

LVK Svinedyrlægerne Nord

Nyt om pattegrises æde strategi

På Foulum forsker Ph.d. studerende Cecilie Kobek Thorsen i pattegrises ædestrategi i stier, hvor der er mælkeerstatning til rådighed. Studiet har givet viden til at inddele pattegrise i forskellige grupper alt efter deres ædestrategi. Se nedenstående

Ædestrategi	Definition
SOWDRINKER	Drikker mælkeerstatning færre end syv gange i ~12 timers periode og drikker 2-5 gange ud af fem diegivninger ved soen
CUPDRINKER	Drikker mælkeerstatning mindst syv gange i ~12 timers periode og drikker færre end 2 gange ud af fem diegivninger ved soen
MIXEDDRINKER	Drikker mælkeerstatning mindst syv gange i ~12 timers periode og drikker 2-5 gange ud af fem diegivninger ved soen
LOWDRINKER	Drikker mælkeerstatning færre end syv gange i ~12 timers periode og drikker færre end 2 gange ud af fem diegivninger ved soen

Forsøget viser at 70 % af pattegrisene er sowdrinkers, 30 % er mixeddrinkers og kun 2 % er cupdrinkers og lowdrinkers. De største grise i kuldet er oftest mixdrinkers efterfulgt af sowdrinkers. De mindste grise i kuldet er cup eller lowdrinkers. Det blev i forsøget fremhævet at mælkeerstatning reducerer dødelighed uanset kuldstørrelse og opstaldning, samt den øger kuldvægten i kuld lagt ud med 17 grise på dag 1. Den forøgede kuldvægt blev ikke observeret ved kuld lagt ud med 14 på dag 1. Den højere kuldvægt i hold lagt ud med 17 blev på bekostning af lavere individuel fravænningsvægt.

LVK Svinedyrlægerne Nord

Svinefagdyrlæge
Teamleder
Tage Rødbro
Mobil: 30994624
Mail: tr@lvk.dk

Svinefagdyrlæge
Bettina Jensen
Mobil: 21715295
Mail: bj@lvk.dk

Svinefagdyrlæge
Charlotte Johannessen
Mobil: 21715298
Mail: cj@lvk.dk

Svinefagdyrlæge
Kjetil Johansen
Mobil: 21689175
Mail: ki@lvk.dk

Svinedyrlæge
Kristian Krogh
Mobil: 21715281
Mail: kkh@lvk.dk

Svinedyrlæge
Annette B. Bech
Mobil: 21715287
Mail: ab@lvk.dk

Svinedyrlæge
Christian Christoffersen
Mobil: 21715302
Mail: cc@lvk.dk